

Bij besmetting is het niet alleen belangrijk om het dier te behandelen, maar ook de vlo, de eitjes en de larven in het huis te bestrijden door de wasbare delen te wassen in de wasmachine en een spray of fogger te gebruiken doorheen het hele huis.

TEKEN

Een teek heeft in elke ontwikkelingsfase bloed nodig om de volgende fase te bereiken. Ze zijn als ze uit het ei komen eerst een larve, dan een nimf en daarna een volwassen teek. Sommige soorten kunnen jarenlang in leven blijven zonder zich te voeden. Teken zitten vaak in hoog gras, struiken of bomen. Ze laten zich vallen op passerende mensen of dieren. Teken hechten zich vast op de huid om bloed te zuigen. Wanneer de teek opgezwollen is, laat hij vanzelf weer los. Je draagt dus best een lange broek tijdens de wandeling...

Zijn teken gevaarlijk voor mens en dier?

Een tekenbeet is op zich pijnloos en kan wel huidirritatie veroorzaken, maar besmette teken kunnen ziekten overdragen zoals de ziekte van Lyme, babesiose,... Deze ziektes kunnen leiden tot ernstige complicaties. De overdracht zou ten vroegste 24u na vasthechting gebeuren, dus is het belangrijk om die teek zo snel mogelijk te verwijderen. Gebruik geen ether of alcohol bij het wegnemen. Probeer de teek zo dicht mogelijk tegen het huidoppervlak vast te nemen met een tekentang of pincet. Trek vervolgens met gelijkmatige kracht de teek weg.

MIJTEN

Huidmijten maken gangen in de huid waardoor ze jeuk en huidbeschadigingen veroorzaken. Deze parasieten zijn niet met het oog zichtbaar en planten zich voort door de eitjes op en in de huid te leggen. Er zijn verschillende soorten mijten en iedere soort vraagt om een specifieke aanpak. De oormijt is de bekendste. Bij infectie met de oormijt is het oorsmeer zwart korrelig. Het geeft veel jeuk, waardoor de kat of de hond aan de oren krabt en vaak met de kop schudt. Dit kan behandeld worden door een oorzalf of door druppeltjes in de nek.



parasieten bij dieren



**Uw specialist in
gezondheid**

WORMEN

De bekendste wormen in België zijn de maagdarmwormen. Jonge dieren kunnen via de baarmoeder of via de moedermelk besmet raken. Volwassen huisdieren krijgen meestal wormen door het eten van besmet vlees of door contact met geïnfecteerde uitwerpselen. Hierin zitten eieren en larven die opgenomen worden door onze huisdieren. In de darm van deze laatste komen de volwassen wormen tot ontwikkeling. De wormen in het darmstelsel produceren opnieuw eieren die met de stoelgang worden uitgescheiden. En zo begint de hele cyclus van de spoelworm, de zweepworm of de haakworm opnieuw... De lintworm wordt altijd overgedragen door vlooien of door knaagdieren.

Hoe kan ik zien of mijn huisdier last heeft van wormen?

Men ziet niet altijd of een dier besmet is. De eigenaar slaat alarm bij het vinden van dode wormen in de ontlasting of op de slaapplek. Ze zien eruit als rijstkorrels (lintworm) of elastiekjes (spoelworm). Bij ergere besmetting vermageren de dieren, is er een groeiachterstand en een doffe vacht doordat ze last hebben van diarree en/of braken. Bij jonge dieren kan er een dik buikje en/of huiduitslag ontstaan.

Zijn wormen gevaarlijk voor de mens?

Bepaalde types wormen kunnen ziektes veroorzaken die overdraagbaar zijn van dier op mens. Vooral kinderen en oudere mensen lopen gevaar om per ongeluk wormeieren op te eten door contact met besmette dieren, besmette plaatsen of door het eten van ongewassen bosvruchten. Om het risico te verkleinen is het belangrijk om de handen te wassen na het buitenspelen of na contact met huisdieren. Tevens is het belangrijk om dagelijks de uitwerpsels op te ruimen, ook in het park. Spoel regelmatig de kattenbak uit met kokend water. Vermijd ongewassen bosvruchten.

Hoe moet ik ontwormen?

Ontwormingsproducten bestaan onder de vorm van pillen, pasta's en druppels voor in de nek.

De ontwormingskuur start men best voor vaccinatie. Jongere katten of honden zijn veel gevoeliger voor wormen en moeten vaker preventief behandeld worden: dieren tot 3 maand om de veertien dagen en dieren tot 6 maand krijgen best maandelijks een ontwormingskuur. Volwassen dieren die vaak buiten komen, moeten 4 keer per jaar ontwormd worden. Volwassen dieren die meer binnen zitten, moeten maar 2 keer per jaar een behandeling ondergaan. Ontwormingsmiddelen werken enkel maar op de dag van behandeling, dus is het belangrijk om oog te hebben voor de nabehandeling.

VLOOIEN

Vlooien zijn beweeglijke bruinzwarte insecten. Ze zuigen bloed bij de gastheer, maar blijven vooral in de omgeving. Het vlooienwijfje legt honderden, tot zelfs duizenden eitjes, die merendeel op de grond terecht komen. Uit de eitjes ontstaan er larven die zich stil en op een donker plekje verpoppen. Deze pop in een cocon kan enkele weken tot jaren overleven. Er bestaan geen bestrijdingsmiddelen tegen cocons. Door trilling (stofzuigen) en warmte ontstaat er uit die cocon een vlo. De volwassen vlo sterft zodra ze in contact komt met een behandeld dier of omgeving. Uw dier kan vlooien krijgen tijdens een wandeling, via de eigenaar die in een besmette omgeving is geweest of via besmette dieren.

Hoe kan ik zien of mijn huisdier vlooien heeft?

Vlooien geven jeuk en irritatie aan onze hond of kat door hun speeksel af te geven in de huid bij bloedzuigen. Door het krabben ontstaan er soms huidletsels of kale plekken. Soms ziet men in de vacht donkere korreltjes zitten. Wanneer deze rood kleuren op een vochtig papier, dan heeft u te maken met door de vlo uitgescheiden uitwerpselen van onverteerd bloed. Maar volwassen vlooien kunnen naast deze huidirritaties ook allerlei ziektes overdragen waaronder lintwormen.

Hoe bestrijd ik vlooien?

Om het risico van vlooibesmetting te beperken moet het huisdier regelmatig preventief behandeld worden. Maximaal 1 keer per maand kan men druppeltjes tussen de schouderbladen aanbrengen.